

Oprensning af pulsåre

Til patienter og pårørende

TEA/Trombendarterektomi

Du indlægges på vores afdeling, hvor vi ser pårørende som en vigtig part i dit forløb. En pårørende kan være familie, nabo eller en god ven, som du føler dig tryk ved og som kan støtte dig både før, under og efter indlæggelsen. Det er vigtigt for os, at du og dine pårørende føler jer inddraget undervejs.

Du er tilbudt en trombendarterektomi operation, også kaldet TEA, hvor kalkaflejringerne fra pulsåren i lysken fjernes og pulsåren eventuelt udvides med en indsyet kunststof- eller vene lap (patch).

Hvem skal have foretaget denne operation?

Patienter med dårlig blodforsyning til benet på grund af svær åreforkalkning i en lyskepulsåre.

Dagen før operationen

Du vil blive indlagt dagen før operationen, hvor du er meget velkommen til at tage dine pårørende med. Du vil komme til at tale med en sygeplejerske og en læge omkring det forventede indlæggelsesforløb.

Du vil eventuelt få taget blodprøver og EKG.

Plejepersonalet vil fjerne hårene fra operationsområdet.

Om aftenen vil du få en blodfortyndende indsprøjtning for at forebygge blodpropper.

På operationsdagen

Du skal have et brusebad. Plejepersonalet vil hjælpe, hvis du har brug for det.

Du må spise indtil 6 timer før og drikke indtil 2 timer før operationen.

Du skal være røgfri 6 timer før operationen.

Hvordan foregår operationen?

Operationen foregår oftest ved rygbedøvelse af underkroppen og benene. Ved rygbedøvelse placeres et tyndt kateter i ryggen. Gennem dette gives smertestillende medicin under operationen og dagene efter.

Der anlægges også et kateter i blæren. Begge katetre fjernes indenfor få dage efter operationen.

Ved operationen lægges et snit i lysken. Pulsåren åbnes og kalken fjernes. Herefter lukkes igen.

Oprensning af pulsåre

Efter operationen

Efter operationen overvåges du på opvågningsafsnittet i nogle timer, hvorefter du kommer tilbage til sengeafdelingen.

At være nyopereret

Træthed

Det er meget normalt, at du er træt efter operationen. Trætheden aftager gradvis.

Ernæring/væske

Din appetit kan være nedsat efter operationen, men det er særdeles vigtigt for både sårheling, træthed og kredsløb at spise en protein- og energirig kost. Det er vigtigt, at du drikker 2-3 liter væske dagligt for at få 'skyllet' kroppen godt igennem samt for at modvirke forstoppelse.

Mobilisering/aktivitet

For at du kan undgå komplikationer og hurtigere komme til kræfter, er det vigtigt, at du allerede samme dag eller dagen efter operationen kommer op at gå. Det er vigtigt, at du er oppe så meget som muligt.

Vejrtrækning

Sørg desuden for at hoste slim op og trække vejret godt igennem, plejepersonalet vil evt. vejlede dit i dette.

Hævelse/nedsat følelse af benet


Dine ben kan hæve efter operationen, derfor er det vigtigt at sidde med benene oppe på en fodskammel samt gå ture rundt i afdelingen. Følesansens i huden kan være forandret pga. nervepåvirkning som følge af operationen. Følelsen vil komme igen af sig selv efter nogle måneder.

Smerter

Efter operationen er det normalt, at have smerter i operationssåret. Styrken af smerter er meget individuelt. For at du kan bevæge dig omkring, er smertestillende medicin en vigtig del af behandlingen. Får du uacceptable smerter, kan du få ekstra smertestillende.

Mave-tarmfunktion

Efter operation er der risiko for forstoppelse. For at forebygge dette er det vigtigt, du kommer op at gå samt spiser og drikker. Desuden tilbydes du afføringsmiddel.



Oprensning af pulsåre

Bekymringer

Mange er bekymrede for operationens forløb og resultat. De anbefalede livsstilsændringer, kan også være grund til spekulationer. Vær ærlig overfor personalet og få talt om det. De kan lytte til dine tanker/overvejelser og vejlede dig i, hvordan du kan komme videre.

Rygning

Det er ikke muligt at ryge under indlæggelsen.

Har du rygetrang under indlæggelsen, vil du få tilbudt nikotinplaster og lignende.

Hvilke komplikationer kan der opstå?

Risikoen for komplikationer er ca. 10%:

- Infektion
- Blødning
- Sivning
- Problemer med heling af operationssåret
- Hævelse af benet
- Nedsat følesans på lårets inderside/brændende fornemmelse i huden

Den udførte TEA kan lukke f.eks. pga. dårligere afløbsforhold for blodet end forventet. I nogle tilfælde kan den renses op, men det kan dog ikke altid lade sig gøre. Man må da foretage et andet indgreb afhængig af forholdene.

Hvad kan jeg selv gøre for at undgå komplikationer?

Så snart du har accepteret tilbuddet om operation, bør du bruge forberedelsestiden til:

- Stoppe med at ryge
- Holde op med at drikke alkohol 4 uger før operationen, hvis du normalt drikker mere end 4 genstande om dagen.
- Være opmærksom på at din sukkersyge er velreguleret
- Det er vigtigt at styrke kredsløbet og fysikken før og efter operationen. Gå ture dagligt
- Du skal spise en sund og varieret kost. Har du haft et utilsigtet vægttab, skal du spise en protein- og energirig kost.

Indlæggelsen varer normalt 3-4 dage, ved en ukompliceret operation.

Du er klar til at blive udskrevet når:

- Operationssåret ikke væsker
- Smerterne er acceptable
- Du spiser og drikker tilstrækkeligt
- Tarmfunktionen er normal
- Du er oppegående uden nyttilkomne hjælpemidler

Hvad kan jeg forvente af operationen?

Ved operationen bliver blodtilførslen til benet forbedret, hvorved smerterne aftager og gangdistancen forbedres.

Det er normalt, at føle sig træt i perioden efter udskrivelsen, men trætheden aftager gradvist. Det går hurtigere, hvis du selv er så aktiv som muligt.

Oprensning af pulsåre

Aktiviteter efter udskrivelse

Efter operationen er det vigtigt at opretholde god blodforsyning til benene samt styrke kredsløbet. Gå en tur dagligt, gerne udendørs, hvis det er muligt. Minimum 30 min. om dagen.

Daglige gøremål og let motion må genoptages umiddelbart. Hård sport, løft over 10 kg samt fysisk krævende arbejde må genoptages i det omfang, det ikke medfører smerter.

Du må føre bil, når du ikke får medicin mærket med advarselstrekant. Der er ellers ingen faste regler for, hvornår du må føre bil, men du skal have fuld kontrol over dine ben og føle dig i stand til det.

Hvornår skal jeg have fjernet sting/clips?

Sting eller clips fjernes hos din egen læge 12-14 dage efter operationen. Du vil blive informeret herom af lægen/plejepersonalet.

Hvornår skal jeg til kontrol?

Du tilbydes kontrol ca. 1 måned efter operationen i Karkirurgisk Ambulatorium i Kolding, Aabenraa eller Esbjerg, afhængig af din bopæl. Kontrollen foretages af en sygeplejerske eller læge.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Du skal være opmærksom på ændringer af operationsområdet, dvs. rødme, varme, hævelse, smerter eller sivning fra operationssåret. Desuden skal du være opmærksom på, hvis foden bliver kold og bleg og følelsesløs. Oplever du disse symptomer, skal du kontakte din egen læge eller lægevagten.

Kontakt:

Hvis du har spørgsmål til aktuelle indlæggelse, eller der opstår komplikationer indenfor 24 timer efter udskrivelse, kan du kontakte Karkirurgiske senge på telefon nr.: 7636 2383. Derefter skal du kontakte din egen læge eller lægevagten.

Karkirurgi, Kolding Sygehus, SLB
Sygehusvej 24
6000 Kolding
Sekretariat tlf.: 7636 2487 (hverdag 8.00 - 15.00)
Karkirurgiske senge tlf.: 7636 2383
Mail: karkirurgiskkolding@rsyd.dk

Kirurgisk Ambulatorium, Esbjerg Sygehus, SVS
Finsensgade 35
6700 Esbjerg
Tlf. nr. 79182316 (hverdage kl. 8.30 - 12.00)

Karkirurgisk Amb., Aabenraa Sygehus, SHS
Kresten Phillipsensvej 15
6200 Aabenraa
Tlf. nr. 79972690 (mandag - torsdag kl. 8. - 16)