

CT-skanning af tyktarmen - Ambulant

Til patienter og pårørende

Hvad er en CT- kolografi?

En CT-kolografi er en computerstyret røntgenundersøgelse. Den kan foretages, såfremt det ikke kan lade sig gøre at lave en normal kikkertundersøgelse af tarmen (koloskopi).

Forberedelser til undersøgelsen:

Det er vigtigt du læser dit indkaldelsesbrev og ser hvilke blodprøveeregler, der er gældende for dig. Er du i tvivl så kontakt den læge/ambulatorium, der har henvist dig til undersøgelsen.

Udtømning: Du har fået tilsendt medicin samt vejledning i en separat kuvert. Det er vigtigt, at du følger udtømningsproceduren nøje, idet utilstrækkelig udtømning kan betyde, at undersøgelsen ikke kan gennemføres.

Kontrast til at drikke: Du får ligeledes sendt 1 lille flaske kontrast (Omnipaque 300 mg J/ml), som du skal blande med 400 ml vand.

- Har du en tid til CT-kolografi inden kl. 12, skal du starte med at drikke kontrasten inden sengetid, dog ikke senere end kl. 22. Kontrasten skal indtages hurtigst muligt.
- Har du en tid til CT-kolografi efter kl. 12, skal du drikke kontrasten senest 6 timer før undersøgelsestidspunktet. Kontrasten skal indtages hurtigst muligt.

OBS! Drik ikke Omnipaque, hvis du er allergisk overfor kontraststof - kontakt da Radiologisk Afdeling.

Hvordan foregår undersøgelsen

Undersøgelsen foregår i en af Radiologisk Afdelings CT-scannere og foretages af specialuddannede radiografer. Undersøgelsen starter med at du får sat et blødt plastikrør op i endetarmen. Herigennem pustes luft ind i tarmen. Derefter tages billeder først mens du ligger på ryggen, og herefter mens du ligger på maven. Nogle patienter skal også have kontrastvæske ind i en blodåre, dette gives i et venflon (drop) ofte anlagt i albuebøjningen eller på håndniveau. Når der tages billeder, vil du blive bedt om at holde vejret i 10-15 sekunder. Det kan undervejs være nødvendigt at blæse lidt mere luft ind i tarmen.

Under undersøgelsen får du noget medicin (Buscopan), som får tarmen til at slappe af. Buscopan kan give bivirkninger som svimmelhed og synsforstyrrelser, derfor anbefaler vi, at man udviser forsigtighed og undgår at køre bil efter undersøgelsen ved symptomer.

Selve undersøgelsen varer ca. 45 min. Har du få kontrastvæske ind i en blodåre i armen, skal du blive på afdelingen 1/2 time efter undersøgelsen.

CT-skanning af tyktarmen - Ambulant

Hvordan føles det?

Når der blæses luft ind, mærker mange en trykken i maven. Dette er helt naturligt, og det hjælper som regel at hoste eller at tage nogle dybe vejrtrækninger. Der anvendes en speciel pumpe, som hele tiden sørger for, at trykket i tarmen ikke bliver for højt.

Efter undersøgelsen

Efter undersøgelsen kan du stadig have en del luft i maven, og det kan være rart at komme på toilettet. Har du fået kontrast via en blodåre, skal du forblive på afdelingen 1/2 time efter undersøgelsen.